



Tostop[®] Niños

Bromhexina 80 mg/100 ml

Alivia el catarro bronquial
y la tos con flema.

SOLUCIÓN ORAL

sabor
frutilla

**mucolítico y
expectorante**

DE LAS SECRECIONES BRONQUIALES

120 ml
VENTA LIBRE

SAVANT



Tostop Niños

Bromhexina 80 mg/100 ml

Alivia el catarro bronquial
y la tos con flema.



Solución oral

VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE
TOMAR EL MEDICAMENTO

● **¿Qué contiene TOSTOP Niños?:**

TOSTOP Niños tiene 80 miligramos de bromhexina clorhidrato cada 100 mililitros de solución oral.

Otros componentes de la solución oral: Polisorbato 80; Glicerina; Acesulfame potásico; Aspartame; Hidroxietilcelulosa sódica; Sorbitol 70%; Benzoato de sodio; Ácido tartárico; Hidróxido de sodio; Esencia de frutilla líquida; Colorante rojo allura C.I. 16.035; Agua purificada c.s.p. 100 ml.

Acciones:

Mucolítico y expectorante de las secreciones bronquiales.

● **¿Para qué se usa TOSTOP Niños?**

TOSTOP Niños es usado para el alivio del catarro bronquial y la tos con flema, facilitando su expectoración.

● **¿Qué personas NO pueden recibir TOSTOP Niños?**

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a la bromhexina o a alguno de los ingredientes de la fórmula.

No utilizar en personas con dificultad para expectorar, que padezcan enfermedad del hígado o riñón o pacientes con asma.

No debe utilizarlo si usted está bajo tratamiento con disulfiram o padece úlcera péptica activa.

● **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar TOSTOP Niños?**

Este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con úlcera gastrointestinal.

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a la bromhexina o a alguno de los ingredientes de la fórmula.

No utilizar en personas con dificultad para expectorar, que padezcan enfermedad del hígado o riñón o pacientes con asma.

Dado que durante el tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede ser indeseable en pacientes incapaces de expectorar.

● **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando TOSTOP Niños?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, raramente pueden aparecer molestias gastrointestinales (náuseas, ardor) o reacciones alérgicas, como por ejemplo erupción de la piel, edema en la cara, dificultad para respirar, aumento de la temperatura y escalofríos.

No debe ingerirse este medicamento si usted está tomando al mismo tiempo productos antitusígenos.
Si la tos **PERSISTE POR MAS DE TRES SEMANAS O EMPEORA CONSULTE A SU MÉDICO.**

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

● Unidad Toxicológica del Hospital
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

● Centro Nacional de Intoxicaciones
Policlínico Prof. A. Posadas
Tel.: (011) 4654 6648

● Centro Toxicológico de la
Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447

¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

Forma de Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos de la luz solar directa y el calor.

Presentación:

1 frasco por 120 ml.



**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS
ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

0810-444-32267

 www.savant.com.ar

Elaborado en SAVANT PHARM S.A. - Complejo Industrial RN N°19, Km 204 - Córdoba - CP: X2432XAB
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico.
E.M.A.M.S. Certificado N° 52112 - Elaborado en Argentina

1003685
Emisión: 03/14
Revisión: 03/13