

Periobacter

Digluconato de Clorhexidina 1%

Antiséptico Bucal
Antiplaca

Uso Terapéutico

Venta Libre

Fórmula:

Cada 100 g. de gel contiene: Digluconato de Clorhexidina 5g. (solución acuosa al 20%), xilitol 10g, propilenglicol, bouquet menta, azul brillante, tween 20, hidroxipropilmetilcelulosa, ácido fosfórico y agua.

Acción Terapéutica:

Periobacter Gel posee una acción antiplaca y antiséptica prolongada en el tiempo. La retención del principio activo nivel de la cavidad bucal, hace que la acción se mantenga por algunas horas a través de un proceso natural de liberación controlada. En general, brinda una profunda y duradera higiene de la cavidad bucal que previene la formación y crecimiento de la placa (responsable de los procesos inflamatorios de las encías, infecciones a distancia y formación de las caries).

Indicaciones:

Debido a la actividad antiplaca de **Periobacter Gel**, está indicado en enfermedades periodontales tales como gingivitis, periodontitis, y en la prevención de la formación de caries. La acción antiséptica del producto se adapta a la higiene bucal en general, y en particular en los casos de difícil aplicación de métodos convencionales de profilaxis. Asimismo, se recomienda su uso en pre y post cirugía bucomaxilar y en halitosis de origen bucal.

Posología:

Se recomienda extender aproximadamente 2 cm. de **Periobacter Gel** sobre el cepillo húmedo y efectuar el cepillado de acuerdo a la técnica indicada por el profesional, por espacio de 3 minutos, una o dos veces por día. El producto no está propuesto para ser ingerido y debe ser salivado después del lavado.

Precauciones y advertencias:

El producto puede causar teñido de las superficies bucales como por ejemplo el esmalte dental, obturaciones, lengua, etc. El manchado por el uso del producto no afecta adversamente la salud de los tejidos de la cavidad bucal. Tales manchas no son permanentes y pueden eliminarse cepillando los dientes con un dentífrico convencional. No obstante en algunos casos puede ser necesaria una

acción profiláctica dental, para eliminar dicha coloración por completo.

Periobacter Gel es incompatible con jabones y otros agentes aniónicos que normalmente están presentes en los dentífricos convencionales. Por consiguiente estos deben emplearse 1 hora antes o después de 2 horas de usar **Periobacter Gel**, enjuagando la boca y el cepillo muy prolijamente.

Cuando se comienza a usar **Periobacter Gel**, en algunos casos pueden experimentarse alteraciones transitorias del sentido del sabor y también una sensación de ardor, que suele ir desapareciendo con el uso.

Contraindicaciones:

El producto no debe ser usado por personas que son sensibles al digluconato de clorhexidina, o a los otros componentes de la fórmula.

Presentación:

Pomos de 60g.

Conservación:

Almacenar a temperaturas que no excedan los 25°C, protegido de la luz.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1005614

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204
Córdoba, CP: X2432XAB
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto
Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico
Inscripción ANMAT N° 0023
Elaborado en Argentina

CIENTÍFICAMENTE

NAF

100% ODONTOLOGÍA

➔ 0810 · 444 · 32267

➔ www.savant.com.ar

SAVANT