

FÓRMULA:

Spray 1%. Cada 100 ml de spray contiene:
Terbinafina clorhidrato.....1 g
Excipientes: Cetomacrogol; Propilenglicol;
Alcohol etílico al 96%; Agua purificada c.s.p.
100 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antimicótico.

USO DEL MEDICAMENTO:

Lea detenidamente esta información.

REPLIDERM está indicado para el tratamiento del pie de atleta y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en ingles, manos y axilas. Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como: picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despellejamiento, sarpullido y ulceración.

MODO DE USO:

Adultos y mayores de 12 años: Este producto debe ser aplicado una vez al día.

- Limpie y seque con cuidado las zonas donde será aplicado el spray.

- Aplique el spray sobre la zona afectada y sobre el área cercana.

Duración del tratamiento: En general la duración del tratamiento es la siguiente: Pie de atleta: 1 semana, aplicando el producto una vez al día. Manos, pies (aplicar entre los dedos) y axilas: de 1 a 2 semanas, aplicando el producto una vez al día. Generalmente a los pocos días del inicio del tratamiento la sintomatología suele disminuir. Continúe normalmente la aplicación por el tiempo recomendado (ver más arriba para cada afección).

ADVERTENCIAS:

No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos ni afecciones vaginales. Pacientes geriátricos: este producto puede ser utilizado en ancianos sin modificar las dosis y el tiempo de tratamiento. Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES:

-Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula del producto.

PRECAUCIONES:

REPLIDERM está indicado solo para uso externo. Evite el contacto con los ojos.

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden manifestarse en el punto de aplicación enrojecimiento, prurito; sin embargo raramente el tratamiento debe ser interrumpido por estas razones.

Consulte a su médico en caso de que aparezcan reacciones adversas no descritas en el prospecto.

Repliderm

Terbinafina 1% Spray

USO EXTERNO

VENTA LIBRE

Antimicótico

60 ML

SAVANT

INTERACCIONES:

Hasta el momento no se han registrado interacciones.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños

Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones

Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.: (011) 4654 6648

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)

Tel.: (011) 4961 8447

CONSERVACIÓN:

Mantener a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos del calor y la luz solar directa. No refrigerar.

PRESENTACIÓN:

Spray 1%: Envases conteniendo 1 frasco con 60 ml.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

1004167 - Emisión 03/14 - Revisión 12/11



www.savant.com.ar

SAVANT

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.
Complejo Industrial RN N°19, Km 204
Córdoba - CP: X2432XAB
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto,
Farmacéutico.
E.M.A.M.S. Certificado N° 54463
Elaborado en Argentina

