

# IBUXIM

## Ibuprofeno 400mg

Comprimidos

Vía de administración oral

**Venta libre**

### **Fórmula:**

Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno 400,00 mg

Excipientes: Almidón pregelatinizado; Celulosa Microcristalina; Lauril Sulfato de sodio; Almidón de maíz; Dióxido de silicio coloidal; Povidona K90; Ácido esteárico; Croscarmelosa sódica; Talco.

### **Acción Terapéutica:**

Analgésico, antipirético, antiinflamatorio.

### **Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información:**

Esta indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

### **Como usar este medicamento:**

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte a su medico.

### **Contraindicaciones:**

Alergia al Ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

### **Advertencias y Precauciones:**

- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre.
- Si los síntomas continúan o si el área dolorida esta roja o hinchada, deberá consultar a su médico.
- Si usted consume 3(tres) o mas vasos diarios de bebidas alcohólicas consulte a su medico antes de tomar este medicamento.
- Aunque el Ibuprofeno tiene las misma indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.
- La ingesta del Ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Consulte a su medico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de ulcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardiaca.

Si usted está tomando algún medicamento, o esta embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardiaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos

elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

### **Reacciones adversas:**

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

### **Interacciones con otros medicamentos:**

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su medico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

### **Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

### **Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**

**(011) 4962-6666 / 2247**

### **Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas**

**(011) 4654-6648 / 4658-7777**

### **Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

**(011) 4961-8447**

### **Presentación:**

Envases conteniendo 90 comprimidos.

### **Conservación:**

Mantener a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, lejos del calor y la luz solar directa.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

1007126

Emisión: 06/20

Revisión: 11/07

SAVANT PHARM S.A.

Complejo Industrial RN N° 19, km 204

Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

E.M.A.M.S. Certificado N° 52.103

Elaborado en Argentina

☎ 0810 · 444 · 32267

🌐 [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)